ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Магнитотерапия и прерывистая пневмокомпрессия как метод реабилитации пациенток с раком молочной железы в разные сроки после хирургического лечения

© *И.С. Евстигнеева, М.Ю. Герасименко, О.М. Перфильева*

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, г. Москва, Российская Федерация

Цель исследования — сравнить эффективность общей магнитотерапии и прерывистой пневмокомпрессии в сочетании с лечебной физкультурой и баланстерапией, занятиями у медицинского психолога у пациенток на 2–4-е сутки и через 1,5–2 мес после хирургического лечения по поводу рака молочной железы.

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 117 пациенток в возрасте от 25 до 70 лет после хирургического лечения по поводу рака молочной железы. Всем пациенткам в разные сроки после оперативного вмешательства (2–4 сутки и через 1,5–2 месяца после операции) был проведен курс прерывистой пневмокомпрессии, затем без перерыва проводилась общая магнитотерапия.

Результаты. Установлено, что данное сочетание методик физической реабилитации способствовало уменьшению болевого синдрома и послеоперационного отека, увеличению объема движений в плечевом суставе, предупреждению развития тяжелой степени лимфостаза и улучшению качества жизни.

Заключение. Вклад общей магнитотерапии в комплекс реабилитационных мероприятий заключается прежде всего в увеличении количества лимфатических коллатералей, повышении оксигенации тканей и противовоспалительном действии. Прерывистая пневмокомпрессия способствует увеличению количества лимфатических коллатералей, стимулирует лимфоотток.

Ключевые слова: медицинская реабилитация, общая магнитотерапия, пневмокомпрессия, рак молочной железы, оперативное лечение рака молочной железы, ранний послеоперационный период, поздний послеоперационный период.

Для цитирования: Евстигнеева И.С., Герасименко М.Ю., Перфильева О.М. Магнитотерапия и прерывистая пневмокомпрессия как метод реабилитации пациенток с раком молочной железы в разные сроки после хирургического лечения. *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация*. 2019;18(2):68–75.
DOI: <https://doi.org/10.17816/1681-3456-2019-18-2-68-75>

Для корреспонденции: Герасименко М.Ю.; E-mail: mgerasimenko@list.ru

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов. Все авторы внесли существенный вклад в проведение поисково-аналитической работы и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию до публикации.

Поступила 11.02.2019

Принята в печать 06.04.2019

MAGNETOTHERAPY AND INTERMITTENT PNEUMOCOMPRESSION AS A METHOD OF REHABILITATION OF PATIENT WITH BREAST CANCER IN DIFFERENT PERIODS AFTER RADICAL MASTECTOMY

© *I.S. Evstigneeva, M.Yu. Gerasimenko, O.M. Perfilieva*

Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Health of the Russian Federation

Objective to develop and compare the effectiveness of General magnetic therapy and intermittent pneumocompression in combination with physical therapy and balance therapy, classes with a medical psychologist in patients on day 2–4 and 1.5–2 months after surgical treatment for breast cancer (breast cancer).

Material and methods. 117 patients aged 25 to 70 years were examined and treated after surgical treatment for breast cancer. All patients underwent intermittent pneumocompression at different times after surgery (2–4 days and 1.5–2 months after surgery), followed by General magnetic therapy without interruption.

Results. It was found that this combination of methods of physical rehabilitation helped to reduce pain and postoperative edema, increase the volume of movements in the shoulder joint, prevent the development of severe lymphostasis and improve the quality of life.

Conclusion. The contribution of General magnetic therapy to the complex of rehabilitation measures is primarily to increase the number of lymphatic collaterals, increase tissue oxygenation and anti-inflammatory

effect. Intermittent pneumocompression contribute to the increase in the number of lymphatic collaterals, stimulates lymph flow.

Key words: *medical rehabilitation, General magnetic therapy, pneumocompression, breast cancer; surgical treatment of breast cancer; early postoperative period, late postoperative period.*

For citation: Evstigneeva IS, Gerasimenko MYu, Perfileva OM. Magnetotherapy and intermittent pneumocompression as a method of rehabilitation of patient with breast cancer in different periods after radical mastectomy. *Russian Journal of the Physical Therapy, Balneotherapy and Rehabilitation.* 2019;18(2):68–75. (In Russ.)
 DOI: <https://doi.org/10.17816/1681-3456-2019-18-2-68-75>

For correspondence: Marina Yu. Gerasimenko; E-mail: mgerasimenko@list.ru

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Conflict of interest. The authors declare no apparent or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Received 11.02.2019

Accepted 06.04.2019

АКТУАЛЬНОСТЬ

Каждый год в мире выявляют более 1,5 млн новых случаев заболевания раком молочной железы (РМЖ). В нашей стране заболеваемость РМЖ составляет 89,6 случая на 100 тыс. женского населения. Но большинство женщин, перенесших радикальное лечение РМЖ, сталкивается с целым рядом медицинских, социальных и психоэмоциональных проблем [1]. Реабилитация таких больных в настоящее время особенно актуальна в связи с тем, что успехи в лечении РМЖ за последние годы привели к увеличению сроков жизни пациенток [2]. А если учесть, что более 40% женщин заболевает в трудоспособном возрасте, то становится понятной высокая значимость проблемы реабилитации этой категории больных [3]. Медицинская реабилитация должна включать раннее начало, строго обоснованный выбор методов и этапность выполнения мероприятий [4]. Методы лечения физическими факторами у пациентов с онкологическими заболеваниями широко используется в последние годы [5], но данном этапе необходимо дифференциальное уточнение методик и подходов к терапии в зависимости от сроков оперативного лечения.

Цель исследования — сравнить эффективность различных методик физиотерапии у пациенток, прооперированных по поводу рака молочной железы в разные сроки после оперативного вмешательства.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением находилось 117 женщин в возрасте от 25 до 70 лет, которым проводи-

лось хирургическое лечение по поводу установленного диагноза РМЖ IB стадии ($T_0N_{1mic}M_0$), IА стадии ($T_0N_1M_0$; $T_1N_1M_0$; $T_2N_0M_0$), IВ стадии ($T_2N_1M_0$; $T_3N_0M_0$), IIIА стадии ($T_3N_1M_0$; $T_{1-2}N_2M_0$). Пациентки методом простой рандомизации были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, клинико-функциональным показателям и различающиеся лишь по назначению общей магнитотерапии (ОМТ) или плацебо в курсах медицинской реабилитации (табл. 1).

Группа 1 (основная группа, $n = 65$) включала женщин, которым на фоне стандартной терапии проводились 2 курса медицинской реабилитации, на 2–4-е сут и через 1,5–2 мес после проведения операции по поводу РМЖ. Каждый курс включал ОМТ, прерывистую пневмокомпрессию (ППК), лечебную физкультуру (ЛФК), баланстерапию и занятия с медицинским психологом.

Группа 2 (группа сравнения, $n=52$) включала женщин, которым на фоне стандартной терапии проводились 2 курса медицинской реабилитации, на 2–4-е сутки и через 1,5–2 мес после проведения операции по поводу РМЖ. Каждый курс включал в себя: ППК, ЛФК, баланстерапию, занятия с медицинским психологом. ОМТ проводилась с плацебо эффектом (т. е. пациентки ложились в аппараты, в которых не включали магнитную индукцию).

Критерии включения в исследование: установленный диагноз РМЖ IB стадии ($T_0N_{1mic}M_0$), IА стадии ($T_0N_1M_0$; $T_1N_1M_0$; $T_2N_0M_0$), IВ стадии ($T_2N_1M_0$; $T_3N_0M_0$), IIIА стадии ($T_3N_1M_0$; $T_{1-2}N_2M_0$), возраст от

Таблица 1

Распределение пациенток по группам ($n = 117$)

Группа	Нозологическая форма	Назначение ОМТ	Число пациенток
1-я	РМЖ IB стадии ($T_0N_{1mic}M_0$), IА стадии ($T_0N_1M_0$; $T_1N_1M_0$; $T_2N_0M_0$), IВ стадии ($T_2N_1M_0$; $T_3N_0M_0$); IIIА стадии ($T_3N_1M_0$; $T_{1-2}N_2M_0$)	+	65
2-я	РМЖ IB стадии ($T_0N_{1mic}M_0$), IА стадии ($T_0N_1M_0$; $T_1N_1M_0$; $T_2N_0M_0$), IВ стадии ($T_2N_1M_0$; $T_3N_0M_0$); IIIА стадии ($T_3N_1M_0$; $T_{1-2}N_2M_0$)	Плацебо	52
Примечание. РМЖ — рак молочной желез; ОМТ — общая магнитотерапия.			

25 до 70 лет. Критерии невключения: возраст моложе 25 лет и старше 70 лет, наличие сопутствующих острых инфекционных заболеваний, тяжелая сопутствующая соматическая патология, психические заболевания (шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, болезнь Альцгеймера, деменция, выраженные расстройства поведения и социальной адаптации, все формы наркомании и хронический алкоголизм), индивидуальная непереносимость процедур магнитотерапии и пневмокомпрессии. Исследование проводили в соответствии с принципами GCP и применимыми национальными нормами, с соблюдением прав и обеспечением безопасности и благополучия участников, которые находились под защитой этических принципов, сформулированных в Хельсинкской декларации. Перед началом исследования было получено добровольное письменное информированное согласие участника исследования. Каждый участник был письменно проинформирован о характере, продолжительности лечебных мероприятий и ожидаемых результатах лечения.

Для оценки качества жизни в обеих группах использовался опросник здоровья MOS SF-36 (Medical Outcomes Study — Short Form 36) в русскоязычной версии. Опросник содержит 36 вопросов, которые объединены в восемь шкал: физического функционирования (ФФ), ролевого функционирования (РФ); интенсивности боли (ИБ); общего здоровья (ОЗ); жизнеспособности (ЖС); социального функционирования (СФ); ролевого эмоционального функционирования (РЭФ); психического здоровья (ПЗ). Показатели ФФ, РФ, ИБ, ОЗ характеризуют физическое здоровье, показатели ЖС, СА, РЭФ, ПЗ — психологическое здоровье. Значения каждой шкалы варьируют между 0 и 100 баллами, где 100 представляет полное здоровье. Пациентки либо самостоятельно заполняли предлагаемые карты, либо опрос больных проводился путем интервьюирования.

Были проведены антропометрические измерения пациенток обеих групп для объективной оценки состояния и его динамики: определение степени отека на основании величины окружности средней трети плеча и предплечья на обеих верхних конечностях на симметричных уровнях (одинаковое расстояние до кончиков пальцев в сантиметрах); определение объема движений в плечевых суставах с помощью угломера: отведение во фронтальной плоскости, сгибание и разгибание в сагиттальной плоскости. Кроме того, оценивали состояние послеоперационной раны (гиперемия, отечность краев раны, инфильтрацию паравульнарных тканей, уровень боли, наличие отделяемого и локализацию патологического процесса в ране) по 20-балльной шкале, общий результат подсчитывали путем суммирования цифровых показателей состояния раны.

При исследовании системы гемостаза определяли тромбиновое время, концентрацию фибриногена в плазме. Кроме того, пациенткам выполнили общий анализ крови.

Инструментальное исследование: ультразвуковое исследование толщины тканей отечной верхней конечности по сравнению с аналогичными тканями здоровой конечности. Также для объективной оценки стадий развития лимфедемы, влияния физических факторов на динамику процесса применяли дистанционную инфракрасную термографию. Для проведения термографии использовали медицинский термограф «ИРТИС 2000-МЕ» (ООО «ИРТИС/ИРТИС», Россия; регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11914 от 15 сентября 2011 г.). Интерпретацию данных термографии производили с помощью программного обеспечения для количественного и качественного анализа изображений TescanAtlas (Tescan, Чехия) и AnalySIS 5.0 (Olimpus, Япония). Для контроля точности полученных результатов использовали программу Image-ProPlus 6.0 (MediaCybernetics, США).

Пациенткам 1-й группы на фоне комплексной терапии в раннем послеоперационном периоде (2–4-е сутки) по запатентованной методике [6] в один день последовательно проводили ППК на обе нижние конечности и туловище на аппарате PulsepressPhysio 12 Pro (MJS Healthcare Ltd, Великобритания; регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1830 от 08.08 2014), затем без перерыва проводилась ОМТ на установке магнитотерапевтической с регулировкой частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля «Магнитотурботрон» (ООО НПФ «ММЦ «МАДИН», Россия; рег. уд. № ФСР 022a2004/0613-04 от 21.09.2004), создающей равномерно вращающиеся вокруг продольной оси пациента импульсные магнитные поля с вариациями индукции 0–3,5 мТл, с частотой 50–150 Гц, 5 раз в неделю, курсом из 15 процедур.

Через 1,5–2 мес на фоне комплексной терапии эта группа больных получала 2-й курс реабилитации, в которую включали следующие физиотерапевтические процедуры: ППК прооперированной верхней конечности и противоположной нижней конечности, затем без перерыва проводилась ОМТ на аппарате УМТИ-3Ф «Колибри-эксперт» (ООО НПФ «ММЦ «МАДИН», Россия; регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11030 от 21.06.2011). Применяли низкочастотное импульсное «бегущее» магнитное поле с частотой 100 Гц с вращением поля 1–2–3 в одну сторону (режим I на аппарате УМТИ-3Ф «Колибри-эксперт»), в 1–2-ю процедуры величина магнитной индукции составляла 30% от максимального значения 3,5 мТл, с 3-й процедуры индукция увеличивается 75% от максимального значения 3,5 мТл, с 12-й по 15-ю процедуры величина магнитной индукции со-

ставляла 50% от максимального значения 3,5 мТл. Продолжительность процедуры — 20 мин, 5 раз в неделю, на курс 15 процедур.

Пациенткам 2-й группы на фоне комплексной терапии в раннем послеоперационном периоде (2–4-е сутки) в один день последовательно проводили ППК на нижние конечности и туловище на аппарате PulsepressPhysio 12 Pro, затем без перерыва проводилась плацебо процедура на установке магнитотерапевтической «Магнитотурботрон», в аппарате не включали магнитное поле. Процедуры проводились 5 раз в неделю, курс — 15 процедур. Через 1,5–2 мес на фоне комплексной терапии эта группа больных получала 2-й курс реабилитации, в него включили ППК прооперированной верхней конечности и противоположной нижней конечности, затем без перерыва проводили плацебо процедуру на аппарате УМТИ-3Ф «Колибри-эксперт» продолжительностью 20 мин. Процедуры проводились 5 раз в неделю, на курс 15 процедур.

Также у всех пациенток в программу реабилитации входили ежедневные занятия ЛФК (дыхательные упражнения и комплекс, направленный на повышение подвижности в плечевом суставе и увеличение объема движения верхних конечностей с постепенно возрастающей нагрузкой) и тренировки с биологической обратной связью по опорной реакции (баланстерапия, принцип работы которой осно-

ван на самостоятельном управлении позой). Все пациентки проходили курс индивидуальных занятий у медицинского психолога.

Полученные результаты оценивали непосредственно перед лечением, после окончания курса процедур и через 2 мес после окончания лечения. Все полученные данные были обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel (2010) и пакета прикладных статистических программ для медико-биологических исследований Statistica 10.0/W RUS. Для анализа количественных переменных применялся метод однофакторного дисперсионного анализа и критерий Манна–Уитни, анализ категориальных переменных проводился при помощи критерия χ^2 Пирсона. Достоверность отличий внутри группы полученных за период наблюдения оценивали с помощью *t*-критерия Вилкоксона. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У пациенток обеих групп отмечалась хорошая переносимость всего лечебного комплекса. При проведении процедур не наблюдалось отрицательных реакций. Ни в одном из случаев не потребовалось прерывания или отмены курса проводимой терапии.

Динамика показателей качества жизни, связанного со здоровьем, у пациенток после проведения операции по поводу РМЖ представлена в табл. 2.

Таблица 2

Динамика показателей качества жизни пациенток после операции на молочной железе по поводу рака молочной железы по данным опросника MOS SF-36 (*M* ± *SD*, баллы)

Шкала MOS SF-36	ОЗ	ФФ	РФ	ИБ	ЖС	СФ	РЭФ	ПЗ
1 группа (<i>n</i> = 65)								
До реабилитации	25,1 ± 2,2	22,2 ± 2,1	33,9 ± 1,2	24,5 ± 4,5	29,2 ± 3,2	41,1 ± 4,2	29,2 ± 3,2	33,9 ± 4,1
После 1-го курса реабилитации	39,9 ± 1,5*	43,9 ± 1,2*	49,7 ± 3,9*	42,7 ± 3,9*	42,2 ± 4,5*	57,5 ± 1,7*	44,7 ± 3,9*	48,7 ± 4,2*
Через 1,5–2 мес после	54,2 ± 2,1*	44,3 ± 1,5*	55,2 ± 2,7*	72,3 ± 6,3*	65,1 ± 2,3*	76,9 ± 3,7*	57,4 ± 2,8*	59,8 ± 5,1*
После 2-го курса реабилитации	74,6 ± 1,9*	56,3 ± 1,8*	76,2 ± 1,7*	82,5 ± 4,3*	76,1 ± 4,3*	81,9 ± 2,7	74,5 ± 2,2*	68,5 ± 3,4*
Через 4 мес после операции	85,2 ± 1,1*	78,3 ± 1,6*	85,2 ± 2,7*	91,3 ± 2,3*	81,1 ± 1,3*	89,9 ± 3,7*	85,4 ± 1,8*	75,2 ± 3,5*
2 группа (<i>n</i> = 52)								
До реабилитации	25,4 ± 1,2	21,9 ± 2,3	33,2 ± 1,1	25,7 ± 3,2	28,8 ± 2,1	40,8 ± 3,5	29,5 ± 3,1	33,7 ± 3,8
После 1-го курса реабилитации	33,5 ± 1,5*	35,9 ± 1,4*	36,7 ± 3,9*	35,7 ± 2,8*	30,3 ± 4,7	41,2 ± 3,9	38,6 ± 6,3	41,6 ± 6,3
Через 1,5–2 мес после	37,4 ± 4,4	53,4 ± 7,3	39,8 ± 4,2	44,2 ± 3,2	42,2 ± 4,5*	57,5 ± 1,7*	44,7 ± 3,9*	48,7 ± 5,2*
После 2-го курса реабилитации	53,5 ± 1,7*	72,1 ± 3,9*	48,6 ± 3,2*	62,1 ± 4,7*	53,4 ± 5,3*	65,8 ± 3,7*	51,1 ± 2,3*	50,4 ± 3,8*
Через 4 мес после	68,3 ± 1,5*	79,1 ± 4,1	58,6 ± 3,4*	79,1 ± 4,5*	63,5 ± 4,4*	75,8 ± 3,9	74,1 ± 2,5*	53,5 ± 1,7*

Примечание: * — достоверные различия ($p < 0,05$) между 1-й и 2-й группами. MOS SF-36 — Medical Outcomes Study — Short Form 36. ОЗ — общее здоровье, ФФ — физическое функционирование, РФ — ролевое функционирование, ИБ — интенсивность боли, ЖС — жизнеспособность, СФ — социальное функционирование, РЭФ — ролевое эмоциональное функционирование, ПЗ — психическое здоровье.

Рис. 1. Снижение суточного объёма лимфорей у пациенток в ранний послеоперационный период

Как видно из табл. 2, после проведенного лечения у пациенток всех групп по сравнению с исходным уровнем повысились показатели качества жизни, это, вероятно, обусловлено фактом начала реабилитации и работой с пациентом специалистов различных специальностей (хирург-онколог, врач-физиотерапевт, врач по ЛФК, медицинский психолог). У пациенток 1-й группы такие показатели, как ОЗ, ФФ, РФ, ИБ, и ЖС, после проведенного лечения были выше ($p < 0,05$), чем во 2-й группе, и продолжали увеличиваться после завершения 2-го курса реабилитации в 1,3–1,5 раза, что, вероятно, обусловлено обезболивающим, противовоспалительным, иммунокорректирующим действием ОМТ, снижением ситуативной и личностной тревоги, устранением астеновегетативных проявлений, улучшением сна, а также пролонгацией этих эффектов.

На фоне проводимого лечения в ранний послеоперационный период у пациенток из обеих групп, снижался суточный объём лимфорей (СОЛ) через дренаж и СОЛ, эвакуированного после снятия дре-

нажа шприцами (СОЛШ). Отмечалось снижение сроков лимфорей из дренажа на 3–5-е сутки (рис. 1), эти показатели были практически одинаковыми и не имели достоверных различий.

У пациенток, прошедших 1-й курс реабилитации через 1,5–2 мес после оперативного лечения, обращала на себя внимание разница в величине окружности между здоровой конечностью и конечностью со стороны оперативного вмешательства. Так, у участниц 1-й группы, которым проводилась ОМТ, эти показатели были меньше, чем у пациенток 2-й группы (табл. 3), достоверные показатели разницы в величине окружности наблюдались и в отдаленные сроки после 2-го курса реабилитации (4 мес после операции), это говорит о необходимости включения в курс реабилитации ОМТ на разных сроках после оперативного лечения РМЖ.

У всех пациенток после оперативного лечения по поводу РМЖ объём движений в плечевом суставе на стороне оперативного вмешательства был снижен по сравнению с нормальными значениями. Так, у пациенток 1-й группы были зарегистрированы следующие показатели: амплитуда сгибания — $60 \pm 1,3^\circ$, разгибания — $18 \pm 0,5^\circ$ и отведения — $65 \pm 1,4^\circ$; во 2-й группе: амплитуда сгибания — $62 \pm 1,3^\circ$, разгибания — $19 \pm 0,5^\circ$ и отведения — $66 \pm 1,4^\circ$. После завершения курса лечения эти функции улучшились. В 1-й группе: сгибание — до $95 \pm 2,4^\circ$, разгибание — $24 \pm 0,8^\circ$, отведение — до $100 \pm 1,5^\circ$; во 2-й группе: сгибание — до $84 \pm 1,8^\circ$, разгибание — $22 \pm 0,8^\circ$, отведение — до $95 \pm 1,5^\circ$ ($p < 0,05$ для всех показателей при сравнении до и после лечения) (рис. 2).

Через 2 мес в 1-й группе сгибание в плечевом суставе составило $160 \pm 2,5^\circ$, разгибание — $30,0 \pm 0,8^\circ$,

Таблица 3

Разница в величине окружности между здоровой и пораженной конечностью ($M \pm SD$, см)

Уровень измерения	На 5 см выше локтевого сустава	На уровне средней трети предплечья	На уровне середины кисти через основание <i>m. thenar</i>
1 группа ($n = 65$)			
До реабилитации	$7,32 \pm 0,02$	$5,2 \pm 0,01$	$3,9 \pm 0,01$
После 1-го курса реабилитации	$5,53 \pm 0,01$	$3,9 \pm 0,01$	$2,1 \pm 0,01$
Через 1,5–2 мес после реабилитации	$4,2 \pm 0,01^*$	$3,5 \pm 0,02^*$	$1,83 \pm 0,2^*$
После 2-го курса реабилитации	$2,4 \pm 0,01$	$1,6 \pm 0,04$	$1,5 \pm 0,02$
Через 4 мес после реабилитации	$0,9 \pm 0,01^*$	$0,3 \pm 0,05^*$	$0,3 \pm 0,01$
2 группа ($n = 52$)			
До реабилитации	$7,24 \pm 0,02$	$5,1 \pm 0,03$	$4,2 \pm 0,02$
После 1-го курса реабилитации	$6,8 \pm 0,02$	$4,3 \pm 0,03$	$2,6 \pm 0,01$
Через 1,5–2 мес после реабилитации	$5,5 \pm 0,01^*$	$3,9 \pm 0,03^*$	$2,9 \pm 0,01^*$
После 2-го курса реабилитации	$2,9 \pm 0,01$	$2,1 \pm 0,01$	$1,8 \pm 0,02$
Через 4 мес после реабилитации	$1,8 \pm 0,02^*$	$1,5 \pm 0,3^*$	$1,9 \pm 0,02^*$

Примечание: * — достоверные различия ($p < 0,05$) между показателями в 1-й и 2-й группах.

Рис. 2. Сравнительная характеристика объёма движений в плечевом суставе на стороне операции у пациенток в разные сроки после оперативного лечения

* — достоверность различий между группами до и после лечения на уровне $p < 0,05$.

отведение — $165 \pm 1,5^\circ$, во 2-й группе: сгибание $155 \pm 2,5^\circ$, отведение $124 \pm 1,8^\circ$, разгибание — $24 \pm 0,5^\circ$ ($p < 0,05$ для всех показателей до и после лечения). После 2-го курса реабилитации показатели объёма движений у пациенток из 1-й группы продолжали нарастать до достижения показателей нормы $175 \pm 1,5^\circ$ сгибание и отведение, разгибание $43 \pm 1,2^\circ$, в то время как во 2-й группе эти показатели были ниже: $165 \pm 1,8^\circ$ — сгибание, $150 \pm 1,5^\circ$ — разгибание, $33 \pm 1,2^\circ$ — отведение. Следовательно, объём движений в плечевом суставе на стороне оперативного вмешательства лучше восстановился у пациенток 1-й группы. Этот факт также свидетельствует о целесообразности раннего начала реабилитационных мероприятий с включением физических факторов и продолжения следующего курса через 1,5–2 мес после оперативного лечения.

Для объективной диагностики состояния рубцов, зоны послеоперационного воспаления, и постлучевого фиброза использовали современные методы инструментальной диагностики: дистанционной инфракрасной термографии, лазерной доплеровской флоуметрии, ультразвуковая диагностика мягких тканей. У пациенток обеих групп, после операционного вмешательства на 2–4-е сутки выявлялась патологическая гипертермия в плечелопаточной области, верхней грудной области и плеча с превышением значений на $1,19 \pm 0,29^\circ\text{C}$. Зоны патологической гипертермии свидетельствуют о нарушении локального крово- и лимфообращения, наличии венозного застоя. До начала лечения у пациенток обеих групп наблюдались выявленные зоны патологической гипертермии, которые свидетельствуют о нарушении локальной гемодинамики (в том числе обусловленном асептическим воспалительным процессом в месте оперативного вмешательства), а также о наличии венозного застоя и мышечно-тонического синдрома плечелопаточной области. Однако среди пациенток

1-й группы после 1-го курса лечения патологическая гипертермия была выявлена только у 19 человек (30%), а во 2-й группе — у 20 (38%) (рис. 3).

Учитывая различия антропометрических данных пациентов, представлялось неинформативным определение средних по группам значений площади поверхности зон патологической температуры. Улучшение температурных характеристик наблюдались через 2 мес после лечения у пациенток из 1-й группы, что говорит о пролонгации клинического эффекта при сочетанном применении ППК и ОМТ (7 (11%) и 10 (19%), а после 2-го курса реабилитации у 3 (5%) пациенток из 1-й группы и 5 (10%) из 2-й группы сохранялась патологическая гипертермия в плечелопаточной области и плеча с превышением значений на $0,78 \pm 0,22^\circ\text{C}$, что свидетельствует о наличии остаточных явлений нарушения локального крово- и лимфообращения; через 4 мес зоны патологической гипертермии не были выявлены у пациенток из 1-й группы, а во 2-й группе оставались у 4 (8%) пациенток, что говорит о положительной динамике нарушенных термографических показателей, при включении в комплекс реабилитационных ОМТ.

На ультразвуковом исследовании был выявлен отек мягких тканей, определяемый локальной пониженной эхогенности мягких тканей с неровными и нечеткими контурами. Через 2 мес после оперативного лечения наблюдалось исчезновение отека в области послеоперационного рубца, плечелопаточной области 60 (92%) пациенток из 1-й группы и 44 (85%) участниц 2-й группы, а через 4 мес признаки отека мягких тканей практически не наблюдали, причем наиболее выраженные изменения были получены при комплексном лечении, тогда как во 2-й группе отек сохранялся в области послеоперационного шва и плечелопаточной области у 5 (10%) человек.

Биохимические показатели крови у пациентов, такие как общий белок, белковые фракции, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, кальций, креатинин, мочевины, глюкоза, билирубин, гамма-ГТ, находились

Рис. 3. Снижение зоны патологической гипертермии у пациенток в разные сроки после оперативного лечения

Рис. 4. Показатели уровня фибриногена, г/л

Рис. 5. Показатели уровня протромбинового времени, секунды

в пределах референсных значений. Эти показатели сохранялись после окончания лечения, и не изменялись в отдаленные сроки, через 2 и 4 мес.

В настоящем исследовании была изучена динамика ряда показателей свертывающей системы крови у женщин после операции по поводу РМЖ, поскольку повышение вязкости крови может усугубить патологический процесс в связи со снижением функции доставки кислорода (рис. 4, 5).

У пациенток из 1-й группы после окончания курсового воздействия с применением ОМТ мы наблюдали снижение вязкости крови, а именно снижение фибриногена, и протромбинового времени, что вероятно было обусловлено механизмом действия магнитотерапии. Снижение концентрации фибриногена сохранялось в течение 4 мес и достигало 10%, а снижение протромбинового времени было зарегистрировано сразу после окончания лечения и также сохранялось в течение 4 мес наблюдения. Этот параметр был выше исходных значений на 15%.

ОБСУЖДЕНИЕ

Целесообразно назначать пациенткам, перенесшим оперативное лечение по поводу РМЖ, курс ОМТ в сочетании с ППК нижних конечностей в раннем послеоперационном периоде, а через 1,5–2 мес — сочетание ОМТ и ППК верхней конечности со стороны оперативного лечения и противоположной нижней конечности, лечебной физкультуры с баланстерапией и занятий у медицинского психолога. Обоснованием к назначению вышеуказанных реабилитационных мероприятий является патогенетически их обоснованное влияние на механизм развития постмастэктомического синдрома, где имеют значение нарушения сосудистой микроциркуляции, уменьшение проявлений синдрома воспаления (отека, гиперемий, болей, нарушение функций), улучшение регенерации различных тканей (нормализация скорости заживления, регенерации, сокращения фазы воспаления, улучшения качества рубцевания), улучшение общего самочувствия у пациентов

в раннем послеоперационном периоде. Это связано с тем, что длительный воспалительный процесс и лимфорея приводят к выраженным рубцовым изменениям в областях лимфаденэктомии, оказывают прямое влияние на развитие постмастэктомического отека у пациенток, не получавших медицинскую реабилитацию.

Благодаря тому, что в при комплексном воздействии, включающем ОМТ, ППК нижних конечностей и туловища применяются основные принципы рефлексотерапии, а именно метод «ляо цы», суть которого состоит в том, что при патологии (повреждении) какой-то части тела активируют точки противоположной стороны, так как повреждение есть следствие дисбаланса между правой и левой половиной тела. Используя данную методику, мы имеем возможность проводить процедуры уже в ранний послеоперационный период (2–4-е сутки), что снижает риск послеоперационных осложнений, а именно развитие гнойно-воспалительных процессов, которые приводят к образованию рубцовых деформаций. За счет активизации лимфатической системы нижних конечностей и туловища происходит уменьшение лимфостаза верхней конечности после радикальной мастэктомии, это объясняется тем что, при повреждении лимфатических сосудов лимфоотток от молочной железы происходит окольным путем через анастомозы, к подмышечным узлам противоположной стороны, а также к паховым лимфатическим узлам [7]. Благодаря воздействию на кожу и тканевые структуры области нижних конечностей и туловища с помощью ОМТ улучшается общий лимфоотток, что не приводит к застою лимфы в прооперированной области [8].

Лимфедема является типичным высокобелковым отеком, который приводит к недостаточной оксигенации тканей из-за нарушения межклеточных контактов, необходимых для беспрепятственной циркуляции газа, в свою очередь гипоксия замедляет функционирование клеток. При лимфедеме избыточная концентрация белка действует как активатор

хронического воспаления. Магнитное поле повышает оксигенацию тканей, оказывает гипокоагулирующее, противоотечное, противовоспалительное действие и обладает седативным эффектом [9]. Пролонгацию противоотечного действия ОМТ при сочетании с ППК можно объяснить за счет ответных реакций организма на действие магнитного поля в виде физико-химических изменений в первичных механизмах гомеостаза и уменьшению возможности формирования белковых отеков, а также включению неспецифических адаптационных реакций иммунной, гуморальной и нервной системы. ОМТ оказывает нормализующее действие на вегетативный и психоэмоциональный статус за счет избирательного действия на возбудимость гипоталамуса корковых и подкорковых структур головного мозга [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было установлено, что назначение медицинской реабилитации у пациенток после операций по поводу РМЖ в ранние сроки (на 2–4-е сутки) и через 1,5–2 мес после оперативного вмешательства способствовало уменьшению болевого синдрома и послеоперационного отека, увеличению объема движений в плечевом суставе, предупреждению развития тяжелой степени лимфостаза и улучшению качества жизни.

Также было показано, что в комплекс реабилитации целесообразно включать ОМТ в комплексе с ЛФК, баланстрапией и занятий у медицинского психолога имеет широкие функциональные возможности и позволяет получить выраженный и долговременный клинический эффект.

ЛИТЕРАТУРА

1. Злокачественные новообразования в России в 2017 году (заболеваемость и смертность) / Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. М., 2018. 250 с.
2. Герасименко М.Ю. Итоги и перспективы развития медицинской реабилитации и курортологии // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2017. № 16(1). С. 4–5. doi: 10.18821/1681-3456-2017-16-1-4-5.
3. Семиглазова Т.Ю., Клыге В.А., Каспаров Б.С., Кондратьева К.О. и др. Международная модель реабилитации онкологических больных // Медицинский совет. 2018. № 10. С. 108–116. doi: 10.21518/2079-701X-2018-10-108-116.
4. Кижяев Е.В., Борисов В.И., Кижяев Ю.Е. Рак молочной железы: Клиника. Диагностика. Лечение. М.: Принталлоги; 2018. 25 с.
5. Юдин В.А., Савкин И.Д. Лечение лимфедемы конечностей (обзор литературы) // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2015. № 4. С. 145–1534.
6. Патент РФ на изобретение № 2687599/22.11.2018. Евстигнеева И.С., Герасименко М.Ю., Куликов А.Г. и др. Способ лечения постмастэктомического синдрома.
7. Герасименко М.Ю., Евстигнеева И.С., Куликов А.Г., Стразжев С.В. Применение общей магнитотерапии и прерывистой пневмокомпрессии в раннем послеоперационном периоде у пациенток после радикальной мастэктомии // Вестник восстановительной медицины. 2018. № 6(88). С. 85–90.
8. Кирьянова В.В., Чабан А.А., Макаров Е.А. Влияние абдоминальной декомпрессии на состояние микроциркуляторного русла у пациентов с рефлекторными проявлениями остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2016. № 15(1). С. 29–34. doi: 10.18821/1681-3456-2016-15-1-29-34.
9. Круглова Л.С., Афанасьева Е.А., Котенко К.В., Корчажкина Н.Б. Использование физиотерапевтических методов в реабилитации больных с онкологической патологией // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. 2016. № 15(2). С. 97–101. doi: 10.18821/1681-3456-2016-15-2-97-101.
10. Епифанов В.А., Корчажкина Н.Б. Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии: Монография. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 504 с.

REFERENCES

1. *Malignant neoplasms in Russia in 2017 (morbidity and mortality)*. Ed. AD Kaprina, VV Starinskogo, GV Petrovoj. Moscow; 2018. (in Russ).
2. Gerasimenko MYu. Results and prospects of development of medical rehabilitation and balneology. *Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation*. 2017;6(1):4-5. doi: 10.18821/1681-3456-2017-16-1-4-5. (in Russ).
3. Semiglazova TYu, Klyuge VA, Kasparov BS, et al. International model of rehabilitation of cancer patients. *Medicinskij sovet = Medical Council*. 2018;10:108-116. doi: 10.21518/2079-701X-2018-10-108-116. (in Russ).
4. Kizhaev EV, Borisov VI, Kizhaev YuE. *Breast cancer: Clinic. Diagnostics. Treatment*. Moscow: Printallogi; 2018. (in Russ).
5. Yudin VA, Savkin ID. The treatment of lymphedema of the limbs (review). *Rossijskij mediko-biologicheskij vestnik imeni akademika I.P. Pavlova*. 2015;4:145-153. (in Russ).
6. Russian patent for invention No. 2687599/22.11.2018 Evstigneeva IS, Gerasimenko MYu, Kulikov AG, et al. *Method of treatment of postmastectomy syndrome*. (In Russ).
7. Gerasimenko MYu, Evstigneeva IS, Kulikov AG, Strazhev SV. Application of the general magnetotherapy and faltering pneumocompression in the early postoperative period at patients after the radical mastectomy. *Vestnik vosstanovitel'noj mediciny*. 2018;6(88):85-90. (in Russ).
8. Kir'yanova VV, Chaban AA, Makarov EA. Effect of abdominal de-compression on the state of the microcirculatory bed in patients with reflex manifestations of osteochondrosis of the lumbosacral spine. *Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation*. 2016;15(1):29-34. doi: 10.18821/1681-3456-2016-15-1-29-34. (in Russ).
9. Kruglova LS, Afanasieva EA, Kotenko KV, Korchazhkina NB. The use of physiotherapy methods in the rehabilitation of patients with cancer. *Physiotherapy, Balneology and Rehabilitation*. 2016;15(2):97-101. doi: 10.18821/1681-3456-2016-15-2-97-101. (in Russ).
10. Epifanov VA, Korchazhkina NB. *Medical rehabilitation in obstetrics and gynecology*: Monography, Moscow: GEOTAR-Media; 2019. (in Russ).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Герасименко Марина Юрьевна, д.м.н., проф. [Marina Yu. Gerasimenko, MD, D.Sci., Professor]; eLibrary SPIN: 7625-6452; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1741-7246>.

Евстигнеева Инна Сергеевна, к.м.н. [Inna S. Evstigneeva, MD, PhD]; eLibrary SPIN: 5163-7726; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9128-0965>.

Перфильева Оксана Михайловна, к.м.н. [Oksana M. Perfiljeva, PhD]; eLibrary SPIN: 5453-5031.